

# BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2019

## MATHÉMATIQUES

Série S

Durée de l'épreuve : 4 heures

**Enseignement de spécialité – Coefficient : 9**

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

*Le sujet est composé de quatre exercices.*

*Le candidat doit traiter tous les exercices.*

*Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.*

*Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.*

**Avant de composer, le candidat s'assurera que le sujet comporte 10 pages, numérotées de 1 à 10.**

**Les pages 9 et 10 sont une annexe, à rendre avec la copie.**

## Exercice 1 (4 points)

Commun à tous les candidats

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (Q.C.M.) qui envisage quatre situations relatives à une station de ski.

Les quatre questions sont indépendantes.

Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse exacte. **Aucune justification n'est demandée.** Une réponse exacte rapporte un point, une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.

- Une étude statistique a établi qu'un client sur quatre pratique le surf.  
Dans une télécabine accueillant 80 clients de la station, la probabilité arrondie au millième qu'il y ait exactement 20 clients pratiquant le surf est :  
a) 0,560                      b) 0,25                      c) 1                      d) 0,103
- L'épaisseur maximale d'une avalanche, exprimée en centimètre, peut être modélisée par une variable aléatoire  $X$  qui suit une loi normale de moyenne  $\mu = 150$  cm et d'écart-type inconnu.  
On sait que  $P(X \geq 200) = 0,025$ . Quelle est la probabilité  $P(X \geq 100)$  ?  
a) On ne peut pas répondre car il manque des éléments dans l'énoncé.                      b) 0,025                      c) 0,95                      d) 0,975
- Dans un couloir neigeux, on modélise l'intervalle de temps séparant deux avalanches successives, appelé temps d'occurrence d'une avalanche, exprimé en année, par une variable aléatoire  $T$  qui suit une loi exponentielle.  
On a établi qu'une avalanche se déclenche en moyenne tous les 5 ans. Ainsi  $E(T) = 5$ .  
La probabilité  $P(T \geq 5)$  est égale à :  
a) 0,5                      b)  $1 - e^{-1}$                       c)  $e^{-1}$                       d)  $e^{-25}$
- L'office de tourisme souhaite effectuer un sondage pour estimer la proportion de clients satisfaits des prestations offertes dans la station de ski.  
Pour cela, il utilise un intervalle de confiance de longueur 0,04 avec un niveau de confiance de 0,95.  
Le nombre de clients à interroger est :  
a) 50                      b) 2 500                      c) 25                      d) 625

**Exercice 2 (6 points)**  
**Commun à tous les candidats**

Le but de cet exercice est d'étudier la suite  $(u_n)$  définie par la donnée de son premier terme  $u_1$  et, pour tout entier naturel  $n$  supérieur ou égal à 1, par la relation :

$$u_{n+1} = (n+1)u_n - 1.$$

**Partie A**

1. Vérifier, en détaillant le calcul, que si  $u_1 = 0$  alors  $u_4 = -17$ .
2. Recopier et compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'en saisissant préalablement dans  $U$  une valeur de  $u_1$ , il calcule les termes de la suite  $(u_n)$  de  $u_2$  à  $u_{13}$ .

```

Pour N allant de 1 à 12
    U ←
Fin Pour
    
```

3. On a exécuté cet algorithme pour  $u_1 = 0,7$  puis pour  $u_1 = 0,8$ .  
 Voici les valeurs obtenues.

Pour $u_1 = 0,7$	Pour $u_1 = 0,8$
0,4	0,6
0,2	0,8
-0,2	2,2
-2	10
-13	59
-92	412
-737	3295
-6634	29654
-66341	296539
-729752	3261928
-8757025	39143135
-113841326	508860754

Quelle semble être la limite de cette suite si  $u_1 = 0,7$  ? Et si  $u_1 = 0,8$  ?

**Partie B**

On considère la suite  $(I_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$ , supérieur ou égal à 1, par :

$$I_n = \int_0^1 x^n e^{1-x} dx.$$

On rappelle que le nombre  $e$  est la valeur de la fonction exponentielle en 1, c'est-à-dire que  $e = e^1$ .

1. Prouver que la fonction  $F$  définie sur l'intervalle  $[0;1]$  par  $F(x) = (-1-x)e^{1-x}$  est une primitive sur l'intervalle  $[0;1]$  de la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[0;1]$  par  $f(x) = xe^{1-x}$ .
2. En déduire que  $I_1 = e - 2$ .

3. On admet que, pour tout entier naturel  $n$  supérieur ou égal à 1, on a :

$$I_{n+1} = (n+1)I_n - 1.$$

Utiliser cette formule pour calculer  $I_2$ .

4. a) Justifier que, pour tout nombre réel  $x$  de l'intervalle  $[0;1]$  et pour tout entier naturel  $n$  supérieur ou égal à 1, on a :  $0 \leq x^n e^{1-x} \leq x^n e$ .

b) Justifier que :  $\int_0^1 x^n e \, dx = \frac{e}{n+1}$ .

c) En déduire que, pour tout entier naturel  $n$  supérieur ou égal à 1, on a :  $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$ .

d) Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ .

### Partie C

Dans cette partie, on note  $n!$  le nombre défini, pour tout entier naturel  $n$  supérieur ou égal à 1, par :

$$\begin{aligned} 1! &= 1 \\ 2! &= 2 \times 1 \\ \text{et si } n \geq 3 : \\ n! &= n = (n-1) \times \dots \times 1 \end{aligned}$$

On a ainsi par exemple

$$\begin{aligned} 3! &= 3 \times 2 \times 1 = 3 \times (2 \times 1) = 3 \times 2! \\ 4! &= 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 4 \times (3 \times 2 \times 1) = 4 \times 3! \\ 8! &= 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 8 \times (7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) = 8 \times 7! \end{aligned}$$

Et, plus généralement :

$$(n+1)! = (n+1) \times n!$$

1. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel  $n$  supérieur ou égal à 1, on a :

$$u_n = n!(u_1 - e + 2) + I_n.$$

On rappelle que, pour tout entier naturel  $n$  supérieur ou égal à 1, on a :

$$u_{n+1} = (n+1)u_n - 1 \text{ et } I_{n+1} = (n+1)I_n - 1.$$

2. On admet que :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n! = +\infty$ .

a) Déterminer la limite de la suite  $(u_n)$  lorsque  $u_1 = 0,7$ .

b) Déterminer la limite de la suite  $(u_n)$  lorsque  $u_1 = 0,8$ .

### Exercice 3 (5 points)

#### Commun à tous les candidats

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

Le but de cet exercice est de déterminer les nombres complexes  $z$  non nuls tels que les points d'affixes  $1$ ,  $z^2$  et  $\frac{1}{z}$  soient alignés.

Sur le graphique fourni en annexe, page 9/10, le point A a pour affixe 1.

#### Partie A : étude d'exemples

##### 1. Un premier exemple

Dans cette question, on pose :  $z = i$ .

- Donner la forme algébrique des nombre complexes  $z^2$  et  $\frac{1}{z}$ .
- Placer les points  $N_1$  d'affixe  $z^2$  et  $P_1$  d'affixe  $\frac{1}{z}$  sur le graphique donné en annexe.

On remarque que dans ce cas les points A,  $N_1$  et  $P_1$  ne sont pas alignés.

##### 2. Une équation

Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation d'inconnue  $z$  :  $z^2 + z + 1 = 0$ .

##### 3. Un deuxième exemple

Dans cette question, on pose :  $z = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

- Déterminer la forme exponentielle de  $z$ , puis celles des nombres complexes  $z^2$  et  $\frac{1}{z}$ .
- Placer les points  $N_2$  d'affixe  $z^2$  et  $P_2$  d'affixe  $\frac{1}{z}$  sur le graphique donné en annexe.

On remarque que dans ce cas les points A,  $N_2$  et  $P_2$  sont alignés.

#### Partie B : étude du cas général

Soit  $z$  un nombre complexe non nul.

On note N le point d'affixe  $z^2$  et P le point d'affixe  $\frac{1}{z}$ .

- Établir que, pour tout nombre complexe  $z$  différent de 0, on a :

$$z^2 - \frac{1}{z} = (z^2 + z + 1) \left( 1 - \frac{1}{z} \right).$$

- On rappelle que si  $\vec{U}$  est un vecteur non nul et  $\vec{V}$  un vecteur, d'affixes respectives  $z_{\vec{U}}$  et  $z_{\vec{V}}$ , les vecteurs  $\vec{U}$  et  $\vec{V}$  sont colinéaires si et seulement si il existe un nombre réel  $k$  tel que  $z_{\vec{V}} = k z_{\vec{U}}$ .

En déduire que, pour  $z \neq 0$ , les points A, N et P définis ci-dessus sont alignés si et seulement si  $z^2 + z + 1$  est un réel.

3. On pose  $z = x + iy$ , où  $x$  et  $y$  désignent des nombres réels.  
Justifier que :  $z^2 + z + 1 = x^2 - y^2 + x + 1 + i(2xy + y)$ .
4. a) Déterminer l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z \neq 0$  tels que les points  $A$ ,  $N$  et  $P$  soient alignés.  
b) Tracer cet ensemble de points sur le graphique donné en annexe.

### Exercice 4 (5 points)

#### Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité

Le but de cet exercice est d'envisager plusieurs décompositions arithmétiques du nombre 40.

#### Partie A :

*Les questions 1., 2. et 3. sont indépendantes.*

1. Sans justifier, donner deux nombres premiers  $x$  et  $y$  tels que  $40 = x + y$ .
2. On considère l'équation  $20x + 19y = 40$ , où  $x$  et  $y$  désignent deux entiers relatifs.  
Résoudre cette équation.
3. Le nombre 40 est une somme de deux carrés puisque  $40 = 2^2 + 6^2$ . On veut savoir si 40 est aussi différence de deux carrés, autrement dit on s'intéresse à l'équation  $x^2 - y^2 = 40$ , où  $x$  et  $y$  désignent deux entiers naturels.
  - a) Donner la décomposition de 40 en produit de facteurs premiers.
  - b) Montrer que, si  $x$  et  $y$  désignent des entiers naturels, les nombres  $x - y$  et  $x + y$  ont la même parité.
  - c) Déterminer toutes les solutions de l'équation  $x^2 - y^2 = 40$ , où  $x$  et  $y$  désignent deux entiers naturels.

#### Partie B : « sommes » de cubes

*Les questions 1. et 2. sont indépendantes.*

Certains nombres entiers peuvent se décomposer en somme ou différence de cubes d'entiers naturels.

Par exemple :

$$13 = 4^3 + 7^3 + 7^3 - 9^3 - 2^3$$

$$13 = -1^3 - 1^3 - 1^3 + 2^3 + 2^3$$

$$13 = 1^3 + 7^3 + 10^3 - 11^3$$

Dans tout ce qui suit, on écrira pour simplifier « somme de cubes » à la place de « somme ou différence de cubes d'entiers naturels ».

Les deux premiers exemples montrent que 13 peut se décomposer en « somme » de 5 cubes.

Le troisième exemple montre que 13 peut se décomposer en « somme » de 4 cubes.

1. a) En utilisant l'égalité  $13 = 1^3 + 7^3 + 10^3 - 11^3$ , donner une décomposition de 40 en « somme » de 5 cubes.

b) On admet que pour tout entier naturel  $n$  on a :

$$6n = (n+1)^3 + (n-1)^3 - n^3 - n^3$$

En déduire une décomposition de 48 en « somme » de 4 cubes, puis une décomposition de 40 en « somme » de 5 cubes, différente de celle donnée en 1.a).

2. Le nombre 40 est une « somme » de 4 cubes :  $40 = 4^3 - 2^3 - 2^3 - 2^3$ .

On veut savoir si 40 peut être décomposé en « somme » de 3 cubes.

a) Recopier et compléter sans justifier :

Reste de la division euclidienne de $n$ par 9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Reste de la division euclidienne de $n^3$ par 9					1				

b) On déduit du tableau précédent que, pour tout entier naturel  $n$ , l'entier naturel  $n^3$  est congru modulo 9 soit à 0, soit à 1, soit à  $-1$ .

Prouver que 40 ne peut pas être décomposé en « somme » de 3 cubes.





Annexe (à rendre avec la copie)

Exercice 3 :



