

Brevet DNB 2026
Voici le corrigé complet
pour le sujet B
du sujet zéro de l'épreuve de Maths

Correction proposée par
Bruno Swiners
sur
www.coursmathsaix.fr

Partie 1 - Automatismes

pour cette partie SANS calculatrice, nous allons choisir les méthodes amenant les calculs les plus simples.

Question 1

La mesure d'un angle droit est de 90° .

Question 2

on calcule $\frac{8+10+11+11}{4} = \frac{40}{4} = 10$

Question 3

on va calculer 25% de 800 élèves car $25 \times 8 = 200$

méthode 1 : 25% correspond à "un quart" → on calcule $800 : 4 = 200$

méthode 2 : on calcule $\frac{25}{100} \times 800 = \frac{20000}{100} = 200$

Donc il y a 200 élèves qui portent des lunettes

Question 4

à 8h, la température est de 15°C

à 16h, la température est de 30°C

et la température a donc augmenté de $30 - 15 = 15^\circ\text{C}$

Question 5

en 1h (ou 60min), la voiture parcourt 90km

et il lui faut donc 30min pour parcourir 45km (la moitié de 90km)
Comprend la moitié de 60min → réponse **B**.

Question 6

les quatre côtés du losange ont la même longueur 3cm

Donc on a périmètre $ABCD = 4 \times 3\text{cm} = 12\text{cm}$

Question 7

on résout l'équation $4x - 3 = 20$

$$4x = 20 + 3$$

$$x = \frac{20+3}{4}$$

→ réponse **D**

on garde juste le calcul ici sans donner le résultat.

Question 8

on peut utiliser ici le théorème de Thalès.

on a $\frac{BD}{BA} = \frac{BE}{BC} = \frac{DE}{AC}$ soit $\frac{3}{BA} = \frac{4,5}{BC} = \frac{4}{6}$

et on utilisera $\frac{3}{BA} = \frac{4}{6}$ pour calculer la longueur AB.

Question 9

on part d'une variable égale à 1

puis on obtient $8 \times 1 = 8$ (avec la ligne 4)

puis $8+10=18$ (avec la ligne 5)

puis $18:2=9$ (avec la ligne 6)

Le résultat obtenu est donc égal à **9**.

Partie 2

Exercice 1

1) on sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180° → on calcule $108^\circ + 36^\circ = \boxed{144^\circ}$
 et on obtient $\widehat{ACB} = 180^\circ - 144^\circ = \boxed{36^\circ}$

2) a) on a $(AB) \parallel (EC)$ et on a $(EB) \perp (EC)$
 donc on a $\boxed{(AB) \perp (EB)}$.

b) sur le sommet B, les angles \widehat{ABC} et \widehat{CBE} sont complémentaires et leur somme est égale à 90° (angle droit).
 on a donc $\widehat{CBE} = 90^\circ - 36^\circ = \boxed{54^\circ}$

3) Les points B, A et D sont alignés $\rightarrow \widehat{BAD} = 180^\circ$ (angle plat).
 ~ sur le sommet A, les angles \widehat{BAC} et \widehat{CAD} sont supplémentaires et on a $\widehat{CAD} = 180^\circ - 108^\circ = \boxed{72^\circ}$
 or, le triangle ADC est isocèle en D, et on a:
 $\widehat{ACD} = \widehat{CAD} = \boxed{72^\circ}$
 La somme des angles d'un triangle étant égale à 180° ,
 on calcule $72^\circ + 72^\circ = 144^\circ$
 et on obtient $\widehat{ADC} = 180^\circ - 144^\circ = \boxed{36^\circ}$.

Exercice 2

1) L'événement A est un événement à 3 issues possibles.
 On a donc $p(A) = \frac{3}{21}$ ← nombre d'issues de l'événement A
← nombre total d'issues
 et on obtient $p(A) = \boxed{\frac{1}{7}}$ (en "simplifiant" par 3)

2) a) on sait que $24 = 1 \times 24$
 $= 2 \times 12$
 $= 3 \times 8$
 $= 4 \times 6$

Donc l'ensemble des diviseurs de 24 est:

$$1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24$$

Mais, pour l'événement B, il faut que ces diviseurs soient compris entre 1 et 21 → les issues de l'événement B sont:

$$\boxed{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12}$$

b) on obtient donc $p(B) = \frac{7}{21}$ ← nombre d'issues de l'événement B
← nombre total d'issues
 soit $p(B) = \boxed{\frac{1}{3}}$

Exercice 3


1) on sait que 1 cm^3 de lessive pèse $1,5 \text{ g}$
 et donc 1600 cm^3 de lessive vont peser $1,5 \times 1600 = 2400 \text{ g}$.
 Donc la masse totale sera égale à $2400 \text{ g} + 200 \text{ g} = \boxed{2600 \text{ g}}$
 lessive paquet vide

2) a) on a $f(x) = 1,5x + 200$ et $f(x)$ va représenter la
 masse totale d'un paquet de lessive pour un volume de
 lessive égal à " x " (cm^3) .

b) La fonction f est une fonction affine. Sa représentation
 graphique est donc une droite pour laquelle on a juste
 besoin de connaître deux points.

→ pour $x=0$, on a $f(0) = 1,5 \times 0 + 200 = 200$
 et on a un point A de coordonnées $(0; 200)$.

→ pour $x=1600$, on sait déjà que $f(1600) = 2600$
 et on a un point B de coordonnées $(1600; 2600)$



3) a) on a laissé les traits apparents sur le graphique ci-dessus
 et on a un volume de 1400 cm^3 pour avoir un paquet de 2300 g

b) on résout l'équation $1,5x + 200 = 2300$

$$\begin{aligned} 1,5x &= 2300 - 200 \\ 1,5x &= 2100 \rightarrow x = \frac{2100}{1,5} = 1400 \end{aligned}$$

on retrouve bien le résultat précédent avec $x = 1400$!

- c) Le volume de ce paré droit sera égal à $12 \times 8 \times 15 = 1440 \text{ cm}^3$ qui est bien supérieur à 1400 cm^3 et le paquet pourra alors parfaitement contenir le volume souhaité.

Exercice 4

1) on a $91 = 7 \times 13$ et $77 = 7 \times 11$

91	7	77	7
13	13	11	11
1	1		1

soit $91 = \boxed{7} \times 13$

et $77 = \boxed{7} \times 11$.

- 2) il faut que le nombre de groupes correspondent au plus grand diviseur commun de 91 et de 77 (PGCD).

Ici, il n'y a de toute façon qu'un seul diviseur commun pour 91 et 77 : c'est le nombre $\boxed{7}$.

On pourra donc former un maximum de 7 groupes

- 3) chaque groupe sera donc constitué de 13 garçons ($91 : 7 = 13$) et de 11 filles ($77 : 7 = 11$) soit un total de $13 + 11 = \boxed{24}$ élèves par groupe